

Số: /TB-TT DVNN

Chí Linh, ngày 23 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO
Tình hình rầy nâu - rầy lưng trắng
hại lúa xuân năm 2023

Hiện nay, các trà lúa xuân đang thời kỳ trổ, trổ thoát đến đở đuôi, lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt. Rầy nâu, rầy lưng trắng thường xuất hiện và gây hại mạnh vào thời kỳ phát triển này của lúa, đặc biệt khi gặp thời tiết nắng nóng, oi bức, xen kẽ với mưa rào.

Theo điều tra của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Chí Linh: Rầy nâu - rầy lưng trắng đang phát sinh gây hại cục bộ trên các trà lúa, đặc biệt trên các trà lúa trổ đang trổ thoát đến đông sữa, tập trung trên những chân ruộng vằn và vằn trũng. Diện tích nhiễm 65ha, tập trung ở các xã, phường như: Tân Dân, An Lạc, Cổ Thành, Văn An, Chí Minh, Văn Đức... mật độ trung bình 800-1000 con/m², nơi cao 1500-2000 con/m², Rầy đang trưởng thành, trứng và tuổi 1-3. Rầy đang tiếp tục phát sinh mạnh trong những ngày tới với diện tích lan rộng trên các trà lúa, nguy cơ bùng phát dịch rầy là rất cao, gây ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lúa xuân.

Trước tình hình đó Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đề nghị:

- UBND các xã, phường chỉ đạo các HTX nông nghiệp, đội BVTV thường xuyên thăm đồng, nắm chắc tình hình diện tích từng trà lúa, diện tích nhiễm sâu bệnh, đặc biệt Rầy nâu - rầy lưng trắng để có biện pháp phòng trừ kịp thời hiệu quả.

- UBND các xã, phường, các HTXNN chỉ đạo bà con nông dân kiểm tra tình hình rầy nâu - rầy lưng trắng, đặc biệt những diện tích lúa ở chân ruộng vằn và vằn trũng thường xuyên duy trì nước, nếu thấy mật độ rầy từ: 2.000 con/m² hoặc 50 con/khóm trở lên cần phải tiến hành phun trừ ngay bằng thuốc đặc trị:

+ Sử dụng các thuốc: Thời kỳ này cây lúa còn xanh sử dụng thuốc có hoạt chất Nitenpyram hoặc hỗn hợp thuốc chứa Nitenpyram và Pymetrozine để phun. Tuyệt đối không được dùng các thuốc hoặc hỗn hợp thuốc chứa Acetamipride để phun trừ rầy ở giai đoạn này.

+ Phun theo nồng độ, liều lượng khuyến cáo trên bao bì, với những diện tích rầy có mật độ trên 5000 con/m² phải phun tăng lượng nước phun, nếu phun gặp mưa phải phun lại. Khi phun xong 2-3 ngày phải kiểm tra lại, nếu mật độ rầy còn cao phải phun lại lần 2.

Chú ý: Bà con nông dân sử dụng bát sen chụp (sen 2 hoặc 3) để phun, tuyệt đối không sử dụng bát sen phun thẳng để phun thuốc trừ rầy.

- Tiếp tục hướng dẫn nông dân phun trừ sâu cuốn lá nhỏ và bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn cổ bông hại các trà lúa.

- Các HTX DVNN cùng các đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trong toàn thành phố cung ứng đủ thuốc có chất lượng cho bà con nông dân không để thiếu thuốc, sót thuốc, thuốc kém chất lượng lưu hành trên thị trường.

- Đề nghị Xí nghiệp Khai thác Công trình Thủy lợi và các HTX DVNN cung cấp đủ nước tưới cho lúa để công tác phòng trừ rầy đạt hiệu quả cao.

- Đề nghị Đài phát thanh từ thành phố đến cơ sở dành thời lượng thích hợp để đưa tin về tình hình sâu bệnh và biện pháp phòng trừ để bà con nông dân phòng trừ kịp thời và có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND thành phố;
- Chi cục TT- BVTV Tỉnh;
- Các phòng ban liên quan;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: TTDVNN.

GIÁM ĐỐC

Diệp Thị Thu